Ερώτηση:

Καλησπέρα σας! Εδώ και 10 μήνες περίπου αποκτήσαμε ένα αρσενικό ινδικό χοιρίδιο. Ενώ όλα μέχρι στιγμής ήταν φυσιολογικά, έπειτα από τις καλοκαιρινές μας διακοπές (το χοιρίδιο άλλαξε περιβάλλον - μεταφέρθηκε στο σπίτι της αδερφής μου η οποία το φρόντιζε κατά την απουσία μας) το ζωάκι μας δημιούργησε κοντά στη μύτη του μια πληγή (με αίμα) η οποία ενώ σταδιακά έδειξε πως επουλώνεται-έβγαζε ξανά τριχούλες σ' αυτό το σημείο-δυστυχώς μεγάλωσε περισσότερο!! Τώρα στο σημείο υπάρχει μια μεγάλη κόρα μπερδεμένη με τρίχες και το τρωκτικό μας όταν ξύνεται την ανοίγει συχνά. Πώς μπορώ να το βοηθήσω;; Μπορώ να το καθαρίσω με κάποιο τρόπο;; Στην αρχή χρησιμοποιήσαμε με μια μπατονέτα ελάχιστο Betadine το οποίο έδειξε πως το βοήθησε.. Όμως τώρα έχουμε απελπιστεί. Σήμερα, προσπαθήσαμε να το βοηθήσουμε λίγο, αλλά μάλλον έκανα μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί το τρωκτικό μου πρέπει να πόνεσε και ξύνεται τόσο που ξεκόλλησε όλη την κόρα που είχε δημιουργηθεί!!! Η πληγή ξεκινά από τη μύτη και φτάνει σχεδόν μέχρι το αριστερό του μάτι. Να προσθέσω πως το χοιρίδιο το έχει ακόμα η αδερφή μου, γιατί μάθαμε πως βρίσκομαι σε ενδιαφέρουσα και ο σύζυγος δε θέλει να το έχουμε κοντά μας για τυχόν μικρόβια. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Με εκτίμηση!

Απάντηση: Κυρία Αθηνά, το να βάλετε μία φορά betadine δεν λύνει το πρόβλημα. Θα χρησιμοποιούσα κάποια αντιβιοτική αλοιφή με λίγη κορτιζόνη (συνήθως αντενδείκνυται η κορτιζόνη σε ανοιχτά έλκη γιατί επιβραδύνει την επούλωση) αλλά είναι αναγκαίο να μειώσουμε την τάση κνησμού του για να μην ξύνει την πληγή. Πρόβλημα δημιουργείται από τη γειτνίαση με το μάτι γιατί οι συνήθεις δερματικές αλοιφές δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον κερατοειδή. Η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε οφθαλμική αντιβιοτική αλοιφή
με κορτιζόνη και τέτοια είναι η Tobradex. Αν το ζωάκι σας ξύνεται πολύ και γλύφει την αλοιφή θα πρέπει να βάζετε δύο-τρεις φορές την ημέρα. Καλό είναι πριν την εφαρμογή της αλοιφής να καθαρίζετε την περιοχή (χωρίς να την τραυματίζετε) με νωπά μωρομάντηλα (τα οποία έχουν ελεγχμένους αντιαλλεργικούς σαπωνοποιητικούς παράγοντες). Υπάρχει μικρή περίπτωση να υπάρχει και μυκητιακή επιπλοκή... Θα το καταλάβετε αν δεν υποχωρεί μετά από μία εβδομάδα θεραπείας, οπότε θα αναγκαστείτε να κάνετε καλλιέργεια για να πιστοποιήσετε τον τύπο του μύκητα. Ένα άλλο σημείο που προδίδει συνήθως τις μυκητιάσεις είναι ότι προσβάλλεται το σύστοιχο μπροστινό πόδι (που ξύνει την μολυσμένη περιοχή)... Καλή δύναμη...!