Ερώτηση:

Γεια σας,έχω 2 θηλυκές γάτες 1.5 ετών,6-7 κιλά κατά μέσο όρο και τον περασμένο Ιανουάριο τις στείρωσα ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του οίστρου(δεν άντεχα άλλο τη φασαρία). Έχουν κάνει 2 εμβόλια tricat πέρυσι και φέτος θα κάνουν το επόμενο. Εδώ και 3 μέρες έχουμε πάλι τα ίδια σκηνικά οίστρου όπως και πριν τις στειρώσω. Ακριβώς η ίδια συμπεριφορά: νύχτα με έντονο νιαούρισμα σαν κλάμα και γαργάρα μαζί,στήσιμο και η ουρά στην άκρη.Και οι 2 ταυτόχρονα όπως κ πριν τη στείρωση. Τι συμβαίνει; Η στείρωση πήγε καλά, οι πληγές έκλεισαν, αντιβίωση έλαβαν..Σημειωτέον ακριβώς μετά τη στείρωση,έπαψαν να νιαουρίζουν μέχρι πρόσφατα που ξεκίνησαν πάλι. Ευχαριστώ.

Απάντηση: Κα Άντυ, συμβαίνει σπάνια αλλά συμβαίνει! Αιτίες α)Ζητήσατε από τον χειρουργό να μην μένουν έγγυα τα ζώα ή να μην έχουν περίοδο; Στην πρώτη περίπτωση τα ζώα έχουν περίοδο αλλά δεν συλλαμβάνουν επειδή γίνεται μόνο περίδεση σαλπιγγών και το γεννητικό σύστημα μένει ως έχει, ενώ στη δεύτερη αφαιρούνται οι ωοθήκες, οι σάλπιγγες, και το σώμα της μήτρας ως το ύψος του τραχήλου και το ζώο παύει να αισθάνεται "θηλυκό"... β)Υπολειπόμενος ιστός ωοθήκης παρέμεινε μετά το χειρουργείο και οι ορμόνες που παράγει ευαισθητοποιούν το ζώο (ιατρικό ατύχημα; και στα δύο;) γ)Ιστός ωοθήκης που βρίσκεται έκτοπος (εκτός της κανονικής θέσης του) λόγω γενετικής δυσπλασίας. Είναι αδύνατον να το γνωρίζει ο χειρουργός ο οποίος αφαιρεί κανονικά τις ωοθήκες αλλά δεν μπορεί να ξέρει ότι υπάρχουν και αλλού. Συνήθως είναι μικρές συσσωματώσεις κυττάρων προσκολλημένες σε άλλα διπλανά όργανα... δ)Σπανιότερα είναι "αίσθημα αγέλης", όπου τα στειρωμένα ζώα μιμούνται τη συμπεριφορά άλλων θηλυκών της περιοχής που ειναι σε οργασμό. Αν απομακρυνθούν από αυτό το εξωτερικό ερέθισμα σταματάει γρήγορα η συμπεριφορά αυτή γιατί λείπει το εσωτερικό ορμονικό ερέθισμα. ε)"Παραμένουσα συμπεριφορά"...όπου το ζώο ψυχαναγκαστικά επαναλαμβάνει αυτό που συνήθιζε να κάνει πριν τη στείρωση...αλλά αυτό γίνεται σε ζώα που έχουν περάσει πολλούς κύκλους περιόδου πριν στειρωθούν.. ενώ τα δικά σας πρέπει να έχουν περάσει μόνο μια περίοδο. Δοκιμάστε κάποια ηρεμιστικά να δείτε αν σταδιακά βελτιωθούν. Αν δεν δουλέψει, δοκιμάστε να κάνετε ένεση ορμονών στις γάτες σας (σαν να θέλατε να διακόψετε ή να αναβάλετε την περίοδό τους). Αν δουλέψει...τότε θα συμβούλευα μια εξέταση από έμπειρο υπερηχολόγο μήπως μπορέσει να εντοπίσει ύποπτο ιστό που θα μπορούσε να αφαιρεθεί με νέο χειρουργείο...
Αυτά εν ολίγοις! Ενδιαφέρον περιστατικό!

Απάντηση Κας Άντυ:

Γεια σας, και σας ευχαριστώ για τις κατατοπιστικές απαντήσεις σας. Να επισημάνω ότι και στις 2 γάτες έχει γίνει ολική αφαίρεση γεννητικών οργάνων. Επίσης έχουμε εξελίξεις. Τελικώς φαίνεται η μικρότερη (κατά 2 μήνες) γάτα μου να έχει το πρόβλημα και παρασέρνει τη μεγαλύτερη. Πριν 2 μέρες λοιπόν την πέτυχα να έχει καμπουριάσει έντονα, με ουρά κυρτή προς την κοιλιά της, σε στάση σχεδόν όπως ενεργείται. Σκέφτηκα ότι θα κάνει ζημιά. Αλλά τελικώς ζορίστηκε, πόνεσε και έβγαλε ένα γλοιώδες αηδιαστικό κίτρινο υγρό σαν γλίτσα. Το μάζεψα και μύριζε απαίσια αλλά όχι σαν κακά. Σίγουρα αυτό δε βγήκε από τον ποπό της. Ήταν μια ποσότητα όσο μια κουτσουλιά περιστεριού. Έπειτα από αυτό όρμηξε στον καναπέ να ξύσει νύχια.Τι μπορεί να έπαθε;

Απάντηση: Κα Άντυ, το ότι "όρμηξε στον καναπέ να ξύσει νύχια" δείχνει ζώο εκνευρισμένο (από πόνο ή από έντονες ορμόνες). Θα συνιστούσα επίσκεψη στον κτηνίατρο που σας έκανε τη στείρωση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει μείνει ιστός ωοθήκης μέσα στο ζώο (έκτοπος ή όχι). Εάν όντως το υγρό βγήκε από τον κόλπο του ζώου θα συνιστούσα καλλιέργεια από αυτή την περιοχή για να αποκλειστεί η "πυομήτρα του κολοβώματος". Εξετάσεις αίματος, καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος και πιθανώς στη συνέχεια υπέρηχος σε μια προσπάθεια εύρεσης του ωοθηκικού υπολείμματος και ελέγχου του εναπομείναντος γεννητικού συστήματος. Αυτή θα ήταν η πορεία που θα ακολουθούσα.