Ερώτηση:

Καλησπέρα σας και καλή Χρονιά! Ο σκύλος μου (τσοπανόσκυλο 2,5 ετών και 45-50 κιλά) την κοπανήσει από τον κήπο και μάλωσε με ένα άλλο αρσενικό. Τους χώρισα βέβαια αλλά έχει μια αρκετά βαθειά πληγή σε μήκος 6-7 εκ. ακριβώς κάτω από το μάτι του. Από χθες του δίνω ανά 12 ώρες (amoxil 500mg) και ένα brazan για να προλάβω πιθανή μόλυνση ή φλεγμονή. Δεν ξέρω αν κάνω καλά και για πόσο θα πρέπει να τα χορηγήσω. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά, δηλαδή τρώει, κοιμάται κανονικά. Σας ευχαριστώ πολύ!

Απάντηση: Κυρία Πηνελόπη, εάν η πληγή είναι 6-7 πόντοι και ανοιχτή (έχει σκιστεί μέχρι βάθους και δεν είναι απλή εκδορά) θα πρέπει να γίνουν ράμματα. Για αντιβίωση προτιμώ το Augmentin γιατί έχει μεγαλύτερο φάσμα και πιάνει αναερόβια μικρόβια ενώ το Amoxill όχι... Για σκυλί 50 κιλών το minimum είναι ένα Augmentin 625 ανά 12ωρο επί 7 ημερο
. Καλή χρονιά
!