Ερώτηση:

Πριν επτά ημέρες έκανα το δεύτερο εμβόλιο(λεισμανίαση) στο σκυλάκι μου & μετά από περίπου μισή ώρα γέμισε όλο του το σώμα μικρά εξογκώματα το πήγα αμέσως στο γιατρό & του έκανε κορτιζόνη υπήρξε ύφεση σε λίγο & μέχρι το απόγευμα σχεδόν είχαν υποχωρήσει κατά 90% ρώτησα το γιατρό γιατί στο πρώτο εμβόλιο δεν παρουσίασε τίποτα ενώ στο δεύτερο παρουσίασε τα εξογκώματα. Η απάντηση ήταν ότι κάτι άλλο τον πείραξε ίσως έφαγε κάτι όμως δεν έφαγε ούτε ήπιε νερό, ρωτάω να κάνω & το τρίτο εμβόλιο ή όχι κι αν συμβεί πάλι το ίδιο? Το αντιμετώπισαν & άλλοι αυτό από ότι διάβασα σε κάποια site. Το σκυλάκι είναι jack russell αρσενικό 8,5 μηνών βάρους 10 kg περίπου. Ευχαριστώ.

Απάντηση:

Χαίρετε κύριε Βασίλειε. Δίχως αμφιβολία η αλλεργική αντίδραση παρουσιάσθηκε εξαιτίας του εμβολιασμού. Συνήθως, το εμβόλιο κατά της λεισμανίωσης προκαλεί τοπικό οίδημα στην περιοχή πραγματοποιήσεως του, το οποίο οίδημα υποχωρεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση σας είχαμε δυσανάλογη αντίδραση του οργανισμού του κατοικιδίου σας και την εμφάνιση μικρών εξογκωμάτων σε όλο του το σώμα. Είναι πολύ πιθανό να εμφανισθεί αλλεργική αντίδραση και στην επόμενη δόση. Όχι, όμως, και βέβαιο. Σε συνεργασία με τον κτηνίατρο σας θα σταθμίσετε τα θετικά και τα πιθανά αρνητικά και θα λάβετε την απόφαση σας. Να είστε καλά. Ελπίζω να σας βοήθησα και σας εύχομαι καλή Ανάσταση!