Ερώτηση:

Γεια σας. Σας παρακαλώ πολύ δώστε μου μια συμβουλή γιατί έχω τρελαθεί.

Το 2,5 μηνών σκυλάκι μου έκανε το πρώτο του εμβόλιο πριν μια εβδομάδα.Προχθές αφού έφαγε έκανε εμετό κ διάρροια. Μετά ήταν πολύ ήσυχο κ δεν είχε όρεξη για τίποτα. Το πήγα στο κτηνίατρο κ μου είπε ότι ίσως είναι από το στομάχι του. Μου έδωσε δυο σιρόπια, το primperon κ το ersefryl. Χθες το σκυλάκι μου ήταν καλύτερα. Σήμερα όμως χειροτέρεψε κ έκανε εμετό ότι κ να την τάιζα. Ακόμα κ τα σιρόπια της. Την τάιζα με το ζόρι λίγο ρύζι με κοτόπουλο ή κρέας.Μένω σε ένα ορεινό χωριό κ ο κοντινότερος κτηνίατρος είναι 40χλ. Δεν έχω δυστυχώς την δυνατότητα να ξαναπάω το σκυλάκι μου. Ο γιατρός μου λέει να περιμένω αλλά έχω αγχωθεί υπερβολικά κ δεν ξέρω τι να κάνω.

Απάντηση:

Αγαπητή μου κυρία,

ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Σε περιπτώσεις εμετού το πρώτο που πρέπει να φροντίσουμε είναι να ηρεμήσει το στομάχι του ζώου. Αυτό σημαίνει αποχή 24 ωρου από το φαγητό -για τα μεγάλα ζώα- και μισής μέρας για τα μικρά. Απαγορεύεται η ξηρή τροφή ή οτιδήποτε σκληρό και δυσκολόπεπτο. Συνίσταται η χρήση μπλέντερ/μιξερ για να

ρευστοποιούνται οι τροφές. Λίγο ψιλοκομμένο ζυμαρικό (πχ κριθαράκι) καλοβρασμένο με λίγη ντομάτα και αλάτι ανακατεμένο με μια εύκολη πηγή πρωτεϊνών (πχ κιμάς βρασμένος) είναι μια καλή λύση. Το νερό πρέπει να δοσομετρείται (πχ ένα ποτήρι κρασιού κάθε δυο ώρες για ένα μικρόσωμο ζώο) γιατί η "καούρα" του εμετού τα σπρώχνει στην υπερβολική κατανάλωση νερού που προξενεί νέους εμετούς. Εάν αρνείται να φάει μπορείτε να "πασαλείβετε" το ρύγχος με αλεσμένη τροφή όποτε αναγκαστικά θα το γλείψει. Δεν φορτώνουμε με φαγητό το στομάχι. Δώστε το primperan, περιμένετε μια ώρα και δοκιμάστε να ταΐσετε...ανά 8ωρο. Ξεκινάμε με μια βασική ποσότητα -πχ δυο κουταλιές της σούπας- και αν δεν μας κάνει εμετό, αυξάνουμε κατά μια τις κουταλιές ανά 8ωρο. Το ercefuryl μπορείτε να το δίνετε αμέσως μετά το φαγητό και μόνο αν συνεχίζεται η διάρροια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγο μέλι σαν πηγή ενέργειας (πασαλειμμένο στο ρύγχος) αν παίρνει μέρα χωρίς να κρατήσει φαγητό. Αν συνεχιστεί πέραν του διημέρου θα πρέπει αναγκαστικά να πάτε στον γιατρό και να μπει το ζώο σε ορούς. Ελπίζω να μη χρειαστεί και όλο αυτό να είναι περαστικό...

Κωνσταντάρας Γιάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ