Ερώτηση:

Είχα κάνει στη σκυλίτσα μου το εμβόλιο κατά της λεισμανίασης αλλά στη δεύτερη αναμνηστική δόση έκανε αντίδραση και δεν το ξανακάναμε.Μετά από 1 χρόνο της έκανα προληπτικά αιματολογική για λεισμανίαση και βγήκε ύποπτο το δείγμα. Σε ένα μήνα της ξαναέκανα επανέλεγχο και βγήκε πάλι ύποπτο. Ενώ ο κτηνίατρος της μας είπε ότι αν βγει 2 φορές ύποπτο πάει να πει ότι είναι αρνητικό,τώρα μας λέει να πάρει zylapour προληπτικά. Μήπως λόγω του εμβολίου βγαίνει ύποπτο το δείγμα αίματος? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

**Απάντηση:**

Καλημέρα.....

Λόγω του πρωτύτερου εμβολιασμού είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τρόποι να ελέγξετε με εξέταση την σκυλίτσα σας για Λεισμανίωση..... Πιο συγκεκριμένα καλό είναι αν αποφύγετε την εξέταση με ανοσοφθορισμό ( Leishmania IFA IgG ) γιατί είναι όντως πολύ πιθανό να βγαίνει θετικό αποτέλεσμα και να μετρώνται τα αντισώματα τα εμβολιακά. Θα πρέπει να επιλέξετε μέθοδο elisa ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ (Virbac Speed Leish K+) (γιατί αυτό το τεστ ανιχνεύει συγκεκριμένα στοιχεία του παθογόνου παρασίτου της Λεισμανίωσης και όχι γενικώς αντισώματα). Άλλη λύση είναι να κάνετε λήψη υλικού με παρακέντηση λεμφαδένα (μέθοδος FNA) και να γίνει μικροσκοπική διερεύνηση του υλικού. Η δεύτερη μέθοδος πραγματοποιείται αν έχουμε υποψία θετικού αποτελέσματος από την μέθοδο elisa γιατί είναι μέθοδος επώδυνη και με μικρή ακρίβεια. Σε επίπεδο πρόληψης καλό είναι να αποφύγετε την αλλοπουρινόλη (Zylapour) γιατί αποτελεί θεραπευτικό πρωτόκολλο και σε μακροχρόνια χρήση έχει παρενέργειες.... Για την πρόληψη της Λεισμανίωσης χρησιμοποιούμε ειδικές αμπούλες και ειδικά περιλαίμια για την απώθηση σκνίπας/κουνουπιού,σπρευ Σιτρονέλλας/Ευκαλύπτου/Γλανδιόλης κλπ καθώς και

πόσιμο σιρόπι δομπεριδόνης(Leisguard). Σε κάθε περίπτωση ο κτηνίατρος σας θα σας συμβουλέψει για το τι ακριβώς χρειάζεστε και τι πρέπει να προσέξετε .