Ερώτηση:

Καλησπέρα, φιλοξενώ ένα αδέσποτο σκυλάκι κι επειδή εκανε θεραπεια και ήταν να στειρωθεί ο πρώτος εμβολιασμός του έγινε πριν 5 μερες. Σε 20 μέρες πρέπει να γίνει το επαναληπτικό είπε ο κτηνίατρος. Τώρα, επειδή το έχω καιρό βρέθηκε άλλο σπιτι να το φιλοξενήσει. Εχουν όμως μικρο παιδί. Είναι ασφαλές? Πόσο νωρίτερα μπορεί να γίνει το επαναληπτικό και πότε θα είναι ασφαλές να συμβιώσει ο σκύλος με το παιδάκι? Σημείωση ότι ο σκύλος είναι πλέον υγιής γι αυτο και έκανε τωρα τον πρωτο εμβολιασμο.

Ευχαριστώ.

Απάντηση:

Κα Νάσια, πιο σημαντικό από τα εμβόλια (για τη συμβίωση με ανθρώπους) είναι να είναι το ζωάκι καθαρό και αποπαρασιτωμένο. Αυτό σημαίνει να έχουν δοθεί τουλάχιστον δυο κοντινές δόσεις χαπιών για τα παράσιτα του εντέρου (ανά δεκαπενθήμερο) και κατόπιν σταθερά ανά τρίμηνο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει μεταδιδόμενα ενδοπαράσιτα, να έχει μπει αμπούλα ανά μήνα ή κάποιο άλλο δραστικό μέσο που σκοτώνει και απωθεί τα εξωπαράσιτα (ψύλλους/τσιμπούρια/σκνίπα) και να του έχουν γίνει μπάνια (ανά 15νθημερο τουλάχιστον το καλοκαίρι). Ήδη το ζωάκι σας έχει μια 70% προστασία από το πρώτο εμβόλιο (αυτό όμως άφορα τη δίκη του υγεία) και με το επαναληπτικό θα αποκτήσει την ετήσια προστασία. Από τις εμβολιαζόμενες ασθένειες των σκύλων μόνο η Λύσσα, η Λεπτοσπείρωση και η Λεϊσμανίαση είναι μεταδιδόμενες στον άνθρωπο. Οι υπόλοιπες αφορούν μόνο τα σκυλιά. Εύχομαι το σκυλάκι σας να βρει σπιτικό και να ριζώσει κάπου!

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ