Ερώτηση:

Καλημερα σς, εχω ενα toy poodle 2,5 μηνων το οποιο τρεφοταν με κροκετες για κουταβια. Την Τριτη (5 μερες πριν) τ εδωσα καπνιστη γλοπουλα σαν λιχουδια και απο τοτε ξεκινησαν οι διαρροιες. Αρχικα τον αφησα 24ωρο νηστικο απο Τεταρτη εως Πεμπτη ωστε να δω την σοβαροτητα της καταστασης οπως μ ειπε κτηνιατρος. Την Πεμπτη τ πηρα κλινικη διαιτα κροκετα id και αντιδιαρροικα οπως μου ειπε παλι ο κτηνιατρος. Εφαγε αποτομα και εκανε εμετο. Την Παρασκευη λοιπον (εχτες) τον πηγα σε κτηνιατρο μιας και δν ετρωγε, ηταν ανορεκτος για παιχνιδι και ολο κοιμοταν. Ο κτηνιατρος εκανε τεστ για τυφο (βγηκε αρνητικο), του εκανε ορο μιας και ειχε αφυδατωθει και μου ειπε να παρω κονσερβα κλινικη διαιτα της trovet και να του δινω stomorgyl 10 μια φορα την ημερα για 5 ημερες. Γνωριζω ομως οτι τα stomorgyl 10 ειναι για λοιμωξεις της στοματικης κοιλοτητας. Ειναι σωστο να τ δινω για τις διαρροιες. Δεν μ ειπε ακριβως τι εχει το σκυλι.Οι διαρροιες του ηταν εως εντελως νερουλες και απο καφε εως κιτρινες με μικρα κομματακια βλεννας με αιμα. Ανησυχω παρα πολυ. Προσπαθω να τ δωσω το 1/4 του χαπιου(αυτο αντιστοιχει στα κιλα του) ωστε να τ καταπιει (κρατωντας τ το στομα κλειστο με το γνωστο τροπο που δινουμε χαπια στα σκυλια) αλλα αυτος επιμενει να μην τ καταπινει και να τ γλυφει. Ειναι δραστικο ετσι;;; το stomorgyl10 ειναι καταλληλο για αυτο π εμφανισε τ σκυλακι μου; Ευχαριστω εκ των προτερων

Απάντηση