Ερώ τηση:

Καλησπέρα σας!
Ήθελα να κάνω μία ερώτηση για τη γάτα μου που πρόσφατα ανακάλυψα πως πάσχει από αιμομπαρτονέλλωση, το οποίο ανιχνεύτηκε σε εξετάσεις αίματος και επίχρισμα. Τα βασικά στοιχεία από τις εξετάσεις αίματος είναι ο χαμηλός αιματοκρίτης (16) και χαμηλά ερυθρά. Η θεραπεία που μας χορήγησαν είναι κορτιζόνη ενέσιμη 3 φορές ανά 48 ώρες και baytril για 15 ημέρες.
Δεν αμφισβητώ την προτεινόμενη θεραπεία πάραυτα επειδή η κατάσταση είναι σοβαρή κι επειδή παντού διαβάζω για χορήγηση τετρακυκλινών σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και καθημερινή χορήγηση κορτιζόνης, εσείς τί θα προτείνατε?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας και τη βοήθεια!

Απάντηση:

Καλησπέρα σας κα Βικτώρια,

είναι διεθνώς αποδεκτή η χρήση ΚΑΙ των δύο αντιβιοτικών στη θεραπεία της Αιμομπαρτονέλλωσης. Οι τετρακυκλίνες είναι σε χρήση από παλαιότερα ενώ η ενροφλοξασίνη (Baytril) είναι νεώτερο όπλο στη φαρέτρα μας. Η χορήγηση κορτιζόνης είναι απλά υποστηρικτική της αιμοποίησης.

Δεν ξέρω αν η γάτα σας είναι σε ανοσοκαταστολή οπότε η χορήγηση της κορτιζόνης θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Ίσως αυτό σκέφτηκε ο γιατρός σας.

Εν πάση περίπτωση μία νέα εξέταση αίματος σε διάστημα 7-10 ημερών θα δείξει την ανταπόκρισή της

οπότε ο γιατρός σας θα μπορεί να ρυθμίσει ανάλογα τη θεραπεία της.

Εύχομαι να πάνε όλα καλά!

Κωνσταντάρας Ιωάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ